



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Omeprazol

Amp 40 mg (2 ampollas)

Ondansetron

Amp 8 mg (2 amp)

Clorotrimeton

Amp 10 mg (2 ampollas)

Dexametasona

Amp 8 mg (4 amp)

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14296948
MPPS: 73469 - CMFAL. 6100

Nombre del paciente:

Helio Antonio Acuña
Fecha: *22/07/26*

CI:

2.864.707

Edad:

78

Dra. Amnerys Pirona. @tuoncologodeconfianza. Cel. 04146711281



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Nombre del paciente: Meliton Atacho. CI: 2.284.769 Edad: 78

Peso: 60,100 Talla 162 SC 1,64

Esquema cada 28 días.

Fecha: 22 de julio de 2026

ORDENES MEDICAS

1. Aprepitant tomar 125 mg el D1 antes de iniciar la quimioterapia, 80 mg antes del desayuno el D2 y D3.
2. Omeprazol 40 mg iv D1 y D15.
3. Ondansetron 16 mg iv D1 y D15.
4. Dexametasona 12 mg iv D1 y D15.
5. Clorotrimeton 10 mg iv D1 y D15.
6. Nab-Paclitaxel 125 mg/m²: 205 mg iv D1 y D15.
7. Gemcitabina 1000 mg/m²: 1640 mg iv D1 y D15
8. Eritropoyetina 30.000 uds subcutáneo D1,D8,D15 ó 10.000 uds subcutáneo D1,D3,D5,D8,D10,D12,D15,D17,D19 SOS autorización médica.
9. Filgrastim 300 mcg ó 480 mcg subcutaneo D6,D7,D8,D9.
10. Hidratación parenteral 500 cc de solución 0,9% iv post quimioterapia.

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14396948
MPPS 73460 CMFAL 4100

Dra. Amnerys Pirona

Oncología Médica

CI 14.396.948 MPPS 73460 CMFAL 4100



CONTROL DE AUTORIZACION DE TRATAMIENTO ANTINEOPLASICO

CENTRO ASISTENCIAL:

Clínica IFEM

TRATAMIENTO

Nb5 Paclitaxel / Gemcitabina

NOMBRE:

Feliton Atacho

CI:

2.864.769.


EDAD:

78

DIAGNOSTICO:

ADK pancreas

FECHA	CICLO	OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDO:		 Firma
Amnerys Pirona		
CÉDULA DE IDENTIDAD N°:	REGISTRO MPPS:	
14.396.948	73460	

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA MEDICINA ONCOLOGIA
C.I. 14396948
MPPS 73460



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Aprepitant

Tab 125/80 mg

Eritropoyetina

Amp 30.000 uds ó 10.000 uds

Filgrastim

Amp 300 mcg ó 480 mcg



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Rp/Indicaciones:

Aprepitant: tomar 125 mg vía oral el día 1 del tratamiento y 80 mg el D2 y D3.

Eritropoyetina: colocar 30.000 uds subcutáneo D1, D8 y D15 ó 10.000 uds subcutáneo D1,D3,D5,D8,D10,D12,D15,D17,D19. Solo cuando tenga indicación.

Filgrastim: colocar 1 ampolla de 300 mcg ó 480 mcg subcutáneo el D6,D7,D8 y D9 .

Realizar exámenes de laboratorio y acudir a consulta a evaluación y autorización de tratamiento antes de recibir el ciclo siguiente.

Nombre del paciente:

Melitoa Atuelo

Fecha: 22/07/26/

CI:

2.864.769

Edad:

78

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14396948
MPPS 7.000.000.000.000.000

Nombre del paciente:

Melitoa Atuelo

Fecha: 22/07/26/

CI:

2.864.769

Edad:

78

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14396948
MPPS 7.000.000.000.000.000



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Ondansetron ó Vonau Flash

Tab. 8 mg

Procilus D2 ó Prolardii

Sobres

Loperamida

Tab 2 mg

Oncoplus

Alimento en polvo

Milax

Polvo

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14396948
M.P.S. 73460 - CMFOL. #104

Nombre del paciente:

Meliton Aguado

Fecha: 22/07/26

CI:

2-868 769

Edad:

78

Dra. Amnerys Pirona. @tuoncologodeconfianza. Cel. 04146711281



Dra. Amnerys Pirona Peña

Oncólogo Clínico/Medicina Crítica

Rp/Indicaciones:

Ondansetron: tomar 1 tableta cada 8 horas, ó **Vonau flash** colocar 1 tableta debajo de la lengua cada 8 horas por 5 días.

Procilus D2 ó Prolardii: tomar el contenido de 1 sobre cada 12 horas por 5 días.

Loperamida: tomar 2 tabletas y luego 1 tableta cada 6 horas en caso de diarrea, (más de 4 evacuaciones liquidas en el día, sobre su hábito basal).

Se recomienda tomar antes una muestra de heces para descartar proceso infeccioso.

Oncoplus: preparar según las instrucciones y dar 2 veces al día.

Milax: en caso de estreñimiento diluir 1 a 2 medidas en ½ vaso de agua y tomar 1 vez al día.

Acetaminofén/Tramal: tomar 1 tableta cada 12 u 8 horas de acuerdo a la intensidad del dolor.

Tramal gotas: 5 gotas disueltas en agua SOS dolor. (dosis rescate).

Nombre del paciente:

Meliton Aguado

Fecha: 22/07/26

CI:

Edad:

78

Dra. Amnerys Pirona. @tuoncologodeconfianza. Cel. 04146711281

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.I. 14396948
M.P.S. 73460 - CMFOL. #104

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE ONCOLOGICO.

1. El paciente oncológico requiere de manejo de un equipo multidisciplinario por eso es importante que usted cuente con cirujano oncólogo, Internista, nutricionista, Paliativistas, y de acuerdo a su patología y comorbilidades debe tener Cardiólogo, nefrólogo, neumólogo, neurólogo, otros.
2. Es importante que acuda a la consulta para su control regular, evaluación de la tolerancia de su tratamiento, seguimiento del mismo y aclarar dudas y autorización de tratamiento.
3. Debe Usar tapaboca, lavado frecuente de manos, evitar lugares concurridos cerrados y con gran volumen de personas.
4. Realizar actividad física suave como caminata diaria 20-30 minutos, dormir bien.
5. No exponerse al sol directo, utilizar protector solar.
6. Utilizar cepillo dental suave, usar enjuague bucal como Peridont. Utilizar crema corporal hidratante (BRUCEN con urea)
7. Evitar cítricos (en caso de que no los tolere), picantes, alimentos duros o muy calientes, comidas crudas, alimentos procesados, embutidos, enlatados, lácteos, comidas artificiales, vísceras. Disminuir el consumo de carbohidratos, grasas y azúcar.
8. Tomar de 1.5 a 2 litros de agua diario, tomar suero oral, agua de coco.
9. Consumir proteínas como pollo, huevo, carne 1 a 2 veces por semana, frutas, verduras, vegetales cocidos, comer pequeñas porciones 5-6 veces al día.
10. Evitar pescados 5 días antes, 5 días después y durante la quimioterapia.
11. En caso de diarrea tomar Prolardii o Procilus D2, en caso de no mejorar debe realizarse un examen de heces y si no hay proceso infeccioso se recomienda tomar Loperamida 2 tabletas STAT y luego 1 tableta cada 4 a 6 horas de acuerdo a la frecuencia evacuatoria. En caso de malestar general, dolor articular o muscular: acetaminofén 650 mg cada 6 horas o Paracetamol 1 gramo cada 8 horas.
12. Informar en su consulta sobre toxicidades presentadas, y las dudas son aclaradas en consulta.
13. En caso de dolor de fuerte intensidad se recomienda Acetaminofén/tramal 1 tableta cada 8-12 horas dependiendo de la intensidad del dolor y Tramal gotas SOS.
14. **Emergencias en el paciente que recibe quimioterapia por las cuales debe acudir a la EMERGENCIA:** fiebre mayor de 38°C, vómitos que impiden tomar líquidos por más de 12 horas, evacuaciones que no mejoren en 12-24 horas, sangrado en encías, sangre en heces u orina, dificultad para respirar/dolor torácico.
15. **Acudir a consulta con exámenes de laboratorio nuevos para autorizar siguiente ciclo de tratamiento de acuerdo al esquema indicado.**

Dra. Amnerys Piron
MEDICINA CRÍTICA - MEDICINA ONCOLÓGICA
C.R. 1339348
MPPS. 133480 C.A.P. 0197

DRA. AMNERYS PIRONA
ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA
CI: 14396948 MPPS 73460 CM 4100 CEL 04146711281

NOMBRE Y APELLIDO:

Meliton Atuelo

CI:

2.864.769

EDAD:

78

Dx ADC pancreas

Indicaciones:

ACETAMINOFEN/TRAMADOL
Tab 325 mg/37,5 mg

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA
CI: 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100 - CEL: 04146711281

Dra. Amnerys Pirona. Oncologia medica y Medicina critica. Clinica IFEM
consultorio 110, Avenida Miranda Coro-Falcón

DRA. AMNERYS PIRONA
ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA
CI: 14396948 MPPS 73460 CM 4100 CEL 04146711281

NOMBRE Y APELLIDO:

Meliton Atuelo

CI:

2.864.769

EDAD:

78

Dx:

ADC Pancreas

Rp/Indicaciones:

TRAMADOL
Gotas 100 mg/ml

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA
CI: 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100 - CEL: 04146711281

Dra. Amnerys Pirona. Oncologia medica y Medicina critica. Clinica IFEM
consultorio 110, Avenida Miranda Coro-Falcón

DRA. AMNERYS PIRONA
ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA
CI: 14396948 MPPS 73460 CM 4100 CEL 04146711281

NOMBRE Y APELLIDO:

Meliton Atuelo

CI:

2.864.769

EDAD:

78

Dx ADC Pancreas

Indicaciones:

ACETAMINOFEN/TRAMADOL
Tab 325 mg/37,5 mg

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA
CI: 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100 - CEL: 04146711281

Dra. Amnerys Pirona. Oncologia medica y Medicina critica. Clinica IFEM
consultorio 110, Avenida Miranda Coro-Falcón

DRA. AMNERYS PIRONA
ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA
CI: 14396948 MPPS 73460 CM 4100 CEL 04146711281

NOMBRE Y APELLIDO:

Meliton Atuelo

CI:

2.864.769

EDAD:

78

Dx:

ADC Pancreas

Rp/Indicaciones:

TRAMADOL
Gotas 100 mg/ml

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA
CI: 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100 - CEL: 04146711281

Dra. Amnerys Pirona. Oncologia medica y Medicina critica. Clinica IFEM
consultorio 110, Avenida Miranda Coro-Falcón



DRA. AMNERYS PIRONA

ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA

CI:14396948 MPPS:73460 CM:4100 CEL:04146711281

NOMBRE Y APELLIDO:

Hector Huelo

CI:

2.864.769 78.

FECH

Rp/Indicaciones:

Favor: Ecocardiograma

*Paciente con diagnóstico
de Adenocarcinoma
Pancrático pleomórfico
para seguimiento
por Paclitaxel D, Dis.
Ciclos 28 días.*

Dra. Amnerys Pirona

MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA

CI: 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100



DRA. AMNERYS PIRONA

ONCOLOGIA MEDICA/MEDICINA CRITICA

CI:14396948 MPPS:73460 CM:4100 CEL:04146711281

NOMBRE Y APELLIDO

Felipe Atacho

CI:

2.864769

FECHA:

78.

Indicaciones:

Laboratorio

perfil 20.

Dra. Amnerys Pirona
MEDICINA CRITICA - MEDICINA ONCOLOGICA
C.I. 14396948
MPPS: 73460 - CM: 4100